

RIZIKOS GRUPIŲ PACIENTAI SKIEPIJAMI PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS POLISACHARIDINE VAKCINA NEMOKAMAI

VAIKAI (2–18 metų amžiaus, jei neskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos anksčiau):

- sergantis bronchų astma (J45–J46), cistine fibroze (E84), bronhektazine liga (J47);
- sergantis cerebriniu paralyžiumi (G80), mioneuralinių jungčių ir raumenų ligomis (G70–G73);
- turintis įgimtas širdies ydas (Q20–Q25);
- sergantis cukriniu diabetu (E10–E14);
- sergantis navikais (C00–D48);
- sergantis lėtinėmis inkstų ligomis (N04, N18);
- vaikai, kuriems atliekama hemodializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);
- sergantis lėtinėmis kepenų ligomis (K71.3–K71.7, K73–K74, Q44.2);
- esant imunosupresinėms būklėms: turintis imunodeficitą (D80–D84), sergantis reumatinėmis ligomis (M05–M08, M30–M36, M79.0), po kraujodaros kamieninių ląstelių ar žmogaus organų, ar audinių transplantacijos (Z94), esant įgimtai ar įgytai asplenijai (D73.0, Q89.01));
- vaikai su kochleariniais implantais (Z96.2);
- sergantis ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21).

SUAUGUSIEJI (vyresnių nei 18 metų):

- sergantis lėtine inkstų liga, kai glomerulų filtracijos greitis (GFG) $<30\text{ml}/1,73\text{m}^2$ (N18.4–N18.5);
- sergantis nefroziniu sindromu (N04);
- asmenys, kuriems atliekama dializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);
- sergantis navikais (C00–C96, D46–D47);
- asmenys po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (Z94.8);
- asmenys po parenchiminių organų transplantacijos (Z94);
- sergantis reumatinėmis ligomis (M02–M08, M13, M30–M36);
- sergantis kepenų fibroze ir ciroze (K74);
- asmenys, kuriems nustatyta hiposplenizmas ar įgimta asplenija (D73.0, Q89.01);
- asmenys, kuriems nustatytas cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas (G96.0);
- asmenys su kochleariniais implantais (Z96.2);
- sergantis ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21);
- asmenys, kuriems nustatyta jatrogeninė imunosupresija (D89.8).